

Le climat en Wallonie en Octobre 2017 : les dernières chaleurs de la saison de végétation.

Version 2017 revue et améliorée




Fig. 1 Moyenne régionale de 12 stations agrométéorologiques du réseau PAMESEB-CRAW pour les températures, l'ensoleillement et les précipitations.

ramenant des conditions automnales. Les précipitations sont normales ; elles sont tombées en début et en fin de mois. Les journées venteuses ont été fréquentes, donnant à octobre 2017 un caractère agité.

Indicateurs (bio)agro-climatiques

Par la deuxième décennie d'octobre 2017 qui a été chaude et peu pluvieuse, les conditions de croissance de fin de saison de végétation ont été temporairement favorables. Cette dernière période a été suivie d'un refroidissement sans vernalisation.

Observations climatiques


Octobre 2017 a été venteux, pluvieux et temporairement chaud. Le temps dégagé et ensoleillé de la deuxième décennie a fait nettement monter les températures minimales et maximales au-dessus des valeurs normales. Même le sol s'est réchauffé, fait peu fréquent en octobre. Un refroidissement rapide suit alors,

Sommaire

Diagrammes climatiques de 12 stations PAMESEB-CRAW	2
Diagrammes éoliens de quatre stations venteuses de Wallonie	3
Analyse des données climatiques	4
Tableaux des indicateurs agro-climatiques en Wallonie	5
Analyse des indicateurs agro-climatiques en Wallonie	6
Rappels méthodologiques	7


Patrick MERTENS – DGO3/DEMNA – Observatoire wallon de la Santé des Forêts – patrick.mertens@spw.wallonie.be - Tél : +32(0)81 626 448
 Damien ROSILLON – CRAW/U11 – Réseau Pameseb CRAW – d.rosillon@cra.wallonie.be - Tél : +32(0)61 23 10 10

Diagrammes climatiques par station : valeurs décadaires et mensuelles de **Précipitations** en mm (l/m^2) représentée en barres bleu descendantes, **Rayonnement visible** en kJ/cm^2 en barres orange descendantes, **Température dans le sol** à -20 cm en ligne verte ; **Température minimale de l'air** et **Température maximale de l'air**. Tous les diagrammes sont représentés selon la même échelle pour faciliter la comparaison entre stations. Les valeurs observées sont présentées sur un fond de la même couleur correspondant à la variable.



Diagrammes éoliens de quatre stations exposées aux mouvements d'air : **moyenne journalière** en m/s par rapport à la **médiane mensuelle**. Les seuils de 1,5 m/s (5 km/h) - en trait discontinu- et de 5,5 m/s (20 km/h) -en trait plein- correspondent aux limites de temps « calme » et « agité ».

En bas à gauche : **Moyenne journalière de l'indice atmosphérique ONA** par rapport à la médiane.



Analyse des observations climatiques en Wallonie – Octobre 2017 :

Tendances thermiques

- En octobre 2017, la moyenne régionale des températures mensuelles maximales (14,8°C) sont normales. Les températures minimales (8,4°C) se situent à la limite supérieure maximale de la tendance médiane (5,6 à 8,7°C). Les tendances médianes sont inférieures aux valeurs maximales et minimales observées pour la deuxième décennie (11-20/10), dépassements de +2,5°C pour les minima et de +4,1°C pour les maxima. Les maxima de la première décennie (13,5°C) se situent à la limite inférieure de la tendance médiane (13,8 à 17,1°C)
- Les températures minimales les plus élevées sont observées à LLN (9,2°C à 12,1°C). Les maxima les plus chauds sont atteints à Feluy (12,3°C à 14,1°C). Les minima les plus faibles sont atteints à Bergeval (5,9 à 6,7°C) et les maxima les plus bas (9,8 à 16,2°C) à Elsenborn.
- La différence entre les maxima et minima mensuels varie en moyenne de 4,0 à 13,3°C. À Elsenborn, l'amplitude mensuelle est la plus basse (3,9 à 6,6°C). À Bergeval, cette amplitude (6,7 à 13,3°C) est la plus prononcée.
- Les nuits de gelée sont absentes. (Ces valeurs se lisent dans le Tableau A-Col.2).
- Aucun jour n'a été très chaud « caniculaire », avec au moins 17°C pendant la nuit. (Ces valeurs se lisent dans le Tableau A à la Col. 3.)
- En octobre 2017, la température à 20 cm de profondeur dans le sol est en moyenne de 12,6°C. Cela correspond à un refroidissement moyen de 1,9°C en un mois. La température dans le sol durant la deuxième décennie (13,1°C) se situe au dessus (+0,9°C) de la tendance médiane (11,0 à 12,2°C).
- À Feluy, les moyennes de la température dans le sol sont régionalement les plus élevées (12,3 à 14,1°C). À Elsenborn, la température du sol est la plus basse (9,5 à 11,4°C).

Situation climatique en Wallonie



Données PAMESEB, Traitement OWSF

- Le rayonnement visible d'octobre 2017 (19,7 kJ/cm²) se situe à la limite supérieure de la tendance médiane avec un dépassement très net durant la deuxième décennie (11-20/10).

Tendances pluviales

- La moyenne régionale des précipitations cumulées d'octobre 2017 est de 52 mm et se situe dans la tendance médiane pour ce mois (38 à 108 mm) ; elles ont été peu fréquentes durant la deuxième décennie (11-20/10).
- La valeur mensuelle la plus haute s'observe à Elsenborn (78,0 mm). À LLN, les précipitations sont les plus basses (35,7 mm). Ailleurs, les précipitations sont intermédiaires, entre 37 et 71 mm.

Tendances éoliennes

- La vitesse du vent (2,00 m/s) suit la tendance médiane (1,28 à 2,53 m/s). La deuxième décennie (11-20/10) a été la moins venteuse.
- La station la plus venteuse est Haut-le-Wastia (3,29 m/s). À Bergeval, la vitesse du vent a été moindre (0,90 m/s).
- Les diagrammes en étoile de la p. 3 rassemblent les valeurs journalières observées dans les stations « ouvertes » du réseau PAMESEB-CRAW. Ces données mettent en évidence les journées « assez agitées » des 2-7/10, 20-22/10 et 29-30/10, particulièrement à Haut-le-Wastia.
- Ces diagrammes indiquent aussi


la période calme du 13-19/10/2017.

Tendances historiques

La Figure centrale en « Toile » de cette page 4 illustre une situation mensuelle « normale » pour octobre 2017, même si la situation est à la limite supérieure pour les températures. Au niveau décennaire, la deuxième décennie a été anormalement chaude.

Tableaux A : Indicateurs agro-climatiques en Wallonie – Octobre 2017

Observatoire Wallon de la Santé des Forêts




Tableaux B par décades (Col. 1) pour douze stations agro-météorologiques du réseau Pameseb CRAW : Somme des degré-jour par décade de températures <5°C (Col. 2) et >5°C (Col. 3), du déficit de saturation en kPa (Col. 4) et des précipitations journalières >5 mm (ou l/m²) (Col. 5) et de % moyen de la chaleur latente (Col. 6). Le nombre de jour de gelées est indiqué entre parenthèse dans la deuxième colonne. Le nombre de jours de canicule est repris entre parenthèses dans la troisième colonne.

Analyse des indicateurs (bio)agro-climatiques en Wallonie – Octobre 2017 (Tableaux A) :

Dès septembre, la pleine saison de croissance touche à sa fin, par une induction à l'état de dormance des végétaux. Tout maintien de la surface foliaire en septembre et octobre accroît la mise en réserve de substances élaborées qui seront métabolisées au printemps suivant. La longueur du cycle foliaire sera influencée par l'occurrence de sécheresses ou de gelées précoces. La durée du jour se réduit rapidement, à 11h40' en fin septembre à 9h45' en fin octobre.

Les températures atmosphériques baissent rapidement, avec une décroissance plus lente dans le sol. Le sol émet un rayonnement terrestre qui freine le refroidissement atmosphérique automnal. Les précipitations durant cette fin de saison sont fréquemment faibles. Un cumul de sécheresses estivale et automnale peut provoquer des pertes précoces de la surface foliaire.



Compte tenu de ce qui est attendu pour cette période de l'année, l'analyse qui suit permet d'apprécier la situation d'octobre 2017.


Tendances agro-thermiques

- Le **refroidissement cumulé (S TM < 5°C)** n'a pas commencé en octobre 2017. Les maxima sont tous supérieurs à 5°C.
- Le **réchauffement cumulé (S Tm > 5°C)** en octobre 2017 est de 2 677°C. Le réchauffement a été plus important durant la deuxième décennie. Le gain mensuel est de +355°C. Le cumul maximum est de 3 167°C à Feluy ; il est minimum à Bergeval avec 1 598°C.
- Le réchauffement mensuel est maximum à Feluy (+350°C) et minimum à Elsenborn (+196°C). Une faible différenciation se marque en faveur des zones non ardennaises. (Tableau A). Les derniers réchauffements plus importants hors Ardennes se notent aussi à la Figure en étoile ci-dessous.

- La moyenne de la chaleur latente d'octobre 2017 varie de 51,1 à 60,7 % au niveau décennaire. Cette valeur minimale indique le ralentissement de l'activité biologique. La moyenne mensuelle régionale est de 55,7%. Elle est proche de celle de septembre (56,9 %). Par contre, la différence Ardennes-hors Ardennes (1,8%) est marquée.

Tendances agro-hydriques

- La moyenne régionale mensuelle du **déficit de saturation hydrique (DefSat)** d'octobre 2017 est de 0,542 kPa. Cette valeur est supérieure à la limite supérieure de la tendance médiane (0,52). Les valeurs de la deuxième décennie sont anormalement hautes (0,271).



- L'écart entre zones ardennaises et non ardennaises est marqué (graphique en toile ci-à-côté).
- Le cumul de déficit de saturation ne dépasse plus le seuil maximum de la tendance médiane comme régulièrement observé depuis avril, mai et juin 2017.
- Le déficit de saturation mensuel est le plus élevé à LLN et à Jemelle (0,825 kPa) et le plus bas à Willerzie (0,244 kPa) (Tableau A).
- L'estimation des **précipitations arrivant au sol en milieu forestier (Pluie > 5mm)** de 19,4 mm est proche de la limite inférieure de la tendance médiane (15-65 mm). Ces précipitations sont tombées en moyenne durant quatre jours avec un maximum de six jours à Willerzie.
- Willerzie avec 33,3 mm et LLN avec 9,7 mm (voir Tableau A) sont les stations les plus extrêmes.
- Cette variable de précipitation effective sous sa forme cumulée depuis juin 2017 indique un apport régulier de précipitations effectives de juin à septembre compris.

L'indice atmosphérique ONA (Figure en bas à gauche de la page 3)

L'indice ONA évolue régulièrement durant octobre 2017, avec un passage par un maximum du 4 au 7 octobre et du 13 au 15/10. Le temps venteux du 2 au 7 septembre sous l'influence de ce climat maritime s'est ressenti par une couverture nuageuse importante et

brumeuse et de faibles précipitations les 5 au 7 octobre.

Par la deuxième décennie d'octobre 2017 qui a été chaude et peu pluvieuse, les conditions de croissance de fin de saison de végétation ont été temporairement favorables. Cette dernière période a été suivie d'un refroidissement sans vernalisation.

Rappel méthodologique

Réseau d'observations climatiques 2017

L'ensemble des observations climatiques 2017 provient de 12 stations du réseau agro-météorologique Pameseb. Leur localisation est donnée sur le fond de carte des tableaux p. 5. Cette carte représente en vert les principaux massifs boisés de Wallonie et les limites des Directions Forestières du DGO3-SPW.

Au moins deux stations représentent chacune des quatre principales classes du climat régional : l'*Ardenne dite froide* est représentée par les stations d'Elsenborn et de Michamps (bord bleu des cases), l'*Ardenne dite chaude* (bord brun) par les stations de Chassepierre et Willerzie, le climat du *Nord du sillon Sambre-et-Meuse* par les stations de Feluy et de Louvain-la-Neuve (bord rosé) et la région de *Transition* par les stations de Haut-le-Wastia, de Jemelle, de Seny et de Chimay (bord vert). Les deux autres stations sont particulières, d'une part des conditions de climat de fonds de vallée à Bergeval et d'autre part des côtes chaudes de Gaume, à Ruette (bord jaune).

Variables décrites dans l'analyse des observations météorologiques (Diagrammes p. 2).

Voir titre de la page 2.

La situation éolienne est décrite par la vitesse du vent en m/s (à multiplier par 3,6 pour la conversion en Km/h) pour cinq stations venteuses de Wallonie (p. 3). En bas à droite de cette page figure l'évolution de l'indice climatique ONA.

Le deuxième diagramme de la page 4 synthétise la situation régionale selon la même légende qu'en page 2.

Le rayonnement est la moyenne du total des cinq stations. Il est géographiquement moins variable que la précipitation, les températures de l'air et de la vitesse du vent. La température moyenne du sol se calcule sur onze stations.

Indicateurs décrivant les variations agro-climatiques (Tableau p. 5).

Au moins deux stations représentent chacune des quatre principales classes du climat régional : l'*Ardenne dite froide* est représentée par les stations d'Elsenborn et de Michamps (fond bleu des tableaux), l'*Ardenne dite chaude* (fond brun) par les stations de Chassepierre et Willerzie, le climat du *Nord du sillon Sambre-et-Meuse* par les stations de Feluy et de Louvain-la-Neuve (fond rosé) et la région de *Transition* par les stations de Haut-le-Wastia, de Jemelle, de Seny et de Chimay (fond vert). Les deux autres stations sont particulières, d'une part des conditions de climat de fonds de vallée à Bergeval et d'autre part des côtes chaudes de Gaume, à Ruette (fond jaune).

Les variations agro-climatiques sont décrites pour évaluer l'impact du climat courant sur les processus écophysologiques du biotope végétal. Ces variables doivent permettre de comprendre les activités saisonnières de croissance et de développement.

Les variables *agro-thermiques* calculées sont :

- $ST < 5^{\circ}$ (Col. 2) : somme des températures des jours dont le maximum est inférieur à 5°C pour la période allant de début juin à fin mai. Cette valeur est indicatrice pour les réactions de vernalisation et de levée de dormance. Les mois essentiels de lecture de cet indicateur de froid vont de septembre à décembre (ou janvier) ;
- $ST > 5^{\circ}$ (Col. 3) : somme des températures des jours dont le minimum est supérieur à 5°C pour la période allant de début janvier à fin décembre. Cette valeur est indicatrice pour l'activation de la croissance notamment pour le débourrement des bourgeons. Les mois essentiels de lecture de cet indicateur de chaleur vont de février à juin ;
- Chal. Lat % (Col. 6) A* : pourcentage de l'énergie de vaporisation par rapport à l'énergie globale du système (enthalpie) ; elle mesure la part du rayonnement transformée dans les processus d'évapotranspiration (Voir calcul A*).

Les variables *agro-hydriques* sont :

- Def Sat (Col. 4) : déficit de saturation moyen par décennie qui mesure la différence de

pression de vapeur entre l'état actuel d'humidité et l'état de saturation. Cette variable indique l'état de stress hydrique de l'environnement (Voir calcul B*);

- Précip>5mm (ou l/m²) (Col. 5) : somme des précipitations journalières supérieures à 5 l/m² multipliée par 0,7 pour évaluer les précipitations qui arrivent effectivement au niveau du sol lorsqu'il y a un couvert végétal.

Toile mensuelle de synthèse des observations climatiques (p. 4)

Le graphique mensuel est constitué d'une toile à cinq axes pour situer les moyennes mensuelles de températures aériennes minimales et maximales, la température du sol, la somme des précipitations et de la vitesse du vent, en valeurs relatives par rapport aux tendances médianes(*) des deux dernières décennies. Les échelles sont identiques pour toute l'année et décomposées en six graduations. Les valeurs minimales et maximales sont spécifiques à chaque axe et sont indiquées en dessous de la variable. La droite montre les valeurs mensuelles et les zones colorées indiquent les tendances mensuelles médianes(*) pour la Wallonie. Lorsque la droite mensuelle s'écarte de la zone colorée, les observations sont considérées comme basses, hautes ou très haute (si le point mensuel se trouve en dehors des limites du graphique).

Le nombre moyens de jours correspondant à la relation température-humidité fait l'objet d'un graphique spécifique pour les mois estivaux. Il est constitué d'un axe horizontal de température moyenne journalière (°C) et d'un axe vertical de teneur en vapeur d'eau de l'air (g/kg d'air).

- La gamme de la température journalière moyenne va de 12 à 32°C, en cinq classes de 4°C. Les lignes verticales du graphique les moyennes par classes (14, 18, 22, 26 et 30°C);
- La gamme d'humidité de l'air exprimée en g de vapeur d'eau par kg d'air va de 8 à 24 g/kg, en cinq classes d'intervalle de 4g/kg d'air. Les lignes horizontales du graphique ci-après indiquent les moyennes par classes (8, 10, 16, 20, 24 g/kg).
- Afin de prendre référence par rapport à la variable traditionnelle d'humidité relative de l'air (Hr), trois courbes sont représentées, du bas vers le haut; celles de 75%, de 85% et de 95% d'humidité relative.
- Le diamètre des cercles représentés sont proportionnels au nombre de jours correspondant aux situations mensuelles observées. La valeur est lue au centre du cercle.

Graphiques mensuels des indices agro-climatiques.

Deux graphiques décrivent la situation agro-climatique. Le premier représente sous la forme de barres cumulées pour les cinq derniers mois, les sommes mensuelles de déficit de saturation (Def.Sat) en kPa, la somme des températures des jours dont le minima est supérieur à 5°C (S Tm>5°C), et des jours dont le maxima est inférieur à 5°C (S TM<5°C) et de 70% des précipitations des jours à plus de 5 l/m². Il visualise les effets des cinq derniers mois, le plus récent se situe dans le haut des barres cumulées. De chaque côté en couleurs éclaircies de la barre centrale se réfèrent les valeurs respectives correspondantes à 25% et 75% des observations 1995-2014.

Le deuxième graphique illustre les variations régionales de ces mêmes variables pour le dernier mois d'observations, sur base des stations de LLN (rouge), Ht-le Wastia (vert), Chassepierre (brun) et Michamps (bleu). Il visualise les différences agro-climatiques régionales.

Situation atmosphérique générale

La situation atmosphérique générale est donnée par l'indice ONA qui est un facteur climatique déterminant à l'échelle régionale car il dépend de la trajectoire des anticyclones et dépressions qui touchent l'Europe de l'Ouest. Cette influence est particulièrement significative en Wallonie par temps agité, permettant au vent continentaux (ONA <-1,1) ou maritime (ONA >1,1) d'arriver sur cette région. L'indice ONA est particulièrement pertinent entre la fin de l'automne et la fin du printemps.

Les valeurs décennales et mensuelles moyennes sont indiquées dans le tableau moyen de Wallonie (Col.7). (source : ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/cwlinks/norm.daily.nao.index.b500101.current.ascii)

(*)Tendances médianes

Les tendances médianes sont calculées sur base d'une période de 20 ans (1996-2015). La tendance modale ou médiane correspond à la variation de 50 % de la série croissante des 20 valeurs, en prenant comme limites les 5 et 15 valeurs (deuxième et troisième quartiles). Une observation au dessus de la 15^{ième} valeur sera considérée comme haute^H et en dessous de la 5^{ième} comme basse^B.

A* Calcul de la chaleur latente (et sensible)

Le rayonnement net arrivant dans la couche atmosphérique augmente la température de l'air qui peut être plus ou moins humide. Par définition, ce changement de température permet d'évaluer la *chaleur sensible*. Pour chauffer de l'air sec entre 0 et 50°C en conditions atmosphériques normales, il faut 1,009 kJ par kg d'air et par degré d'élévation

d'un degré de température

L'air ambiant contient de la vapeur d'eau. Une part importante du rayonnement net est aussi utilisée pour augmenter la teneur en vapeur d'eau dans l'air. L'augmentation de température de l'air accroît en effet sa capacité de rétention de vapeur d'eau. Par exemple à 90 % d'humidité relative, cette capacité double entre 10 et 20°C. Cette vaporisation d'eau correspond à la *chaleur latente* du rayonnement. La vaporisation d'eau dans l'air est très énergivore, 2 501,6 kJ par kg de vapeur d'eau.

Les valeurs utilisées pour le calcul des équations d'évaluation de la pression de saturation ont été lues dans le tableau présenté sur le site : http://www.devatec.com/pdf/Bases_de_lhumidification.pdf. Les équations appliquées sont (Eq 1°) :

$z = 3,98 \exp(0,064 \text{ Temp})$; pression de saturation = $-0,0028 z^2 + 1,1004 z - 0,541$;
pression réelle = pression de saturation/100*humidité relative - $0,0048 \exp(0,1236 \text{ Temp})$.
Ces équations ont été validées pour les températures allant de 1 à 40 °C

Les variables de vitesse du vent et de pression atmosphérique ne seront pas pris en compte dans le calcul par décade, compte tenu du fait qu'ils sont déjà pris en comptes indirectement dans les mesures physiques d'humidité relative moyenne et de températures et qu'entre-décades ces moyennes sont comparables.

B* Calcul du *déficit de saturation*

La pression de saturation en vapeur d'eau de l'air est calculée selon les équations (Eq 1) ci-dessus. Après avoir validé la méthode, la procédure de calcul adoptée tient compte des valeurs moyennes décadaires de températures minimales et maximales et de l'humidité relative. La différence de saturation entre la pression maximale possible et la valeur réelle est calculée pour la température maximale que minimale. La valeur retenue est la moyenne de ces deux situations thermiques. Ces valeurs décadaires sont ensuite cumulées au niveau du mois.